

هرمزگان ۹۵۰ هکتار سطح زیر کشت کجنج دارد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با پایان یافتن فصل کشت، ۹۵۰هکتار از اراضی کشاورزی این استان زیر کشت کجنج قرار گرفت .
کرووش صادقی افزود: سطح زیر کشت کجنج نسبت به سال گذشته ۳۰ هکتار افزایش یافته است. وی میانگین عملکرد این گیاه را ۹۵۴ کیلوگرم در هکتار عنوان و اضافه کرد: سال گذشته زراعی ۸۷۰ تن دانه روغنی کجنج از مزارع کجنج این استان برداشت.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اعلام اینکه در سال جاری بخر گواهی شده دشتستان دو جهت افزایش عملکرد بین زارعین توزیع شده پیش بینی کرد که نزدیک به یک هزارتن محصول برداشت گردد.صادقی اظهار داشت: بیشترین سطح مزارع کجنج با ۸۱۰ هکتار به شهرستان حاجی آباد اختصاص دارد که از لحاظ سطح زیرکشت و برداشت رتبه نخست استان را دارد.این مقام مسوول بیان داشت: گیاه کجنج در مقایسه با ذرت نیاز به آب کمتری دارد درحالیکه دانه آن درمیانج مختلف شیرینی پزی، روغن کشی و تولید آرد مصرف بیشتری دارد که به همین جهت می تواند جایگزین مناسبی برای تغییر الگوی کشت ذرت باشد.
کجنج گیاهی است یک ساله با ارتفاع حدود یک متر که قسمت انتهایی ساقه آن پوشیده از کرک است برگ های آن پهنی، باریک و نوک تیز است. گل های آن به رنگ سفید یا قرمز، به طور تک تک در کناره برگ های قسمت انتهایی ساقه ظاهر می شوند. میوه این گیاه به صورت کپسول و محتوی دانه های کوچک و مسطح و بیضی است که دانه کجنج نامیده می شود و قسمت مورد استفاده این گیاه است.

گیاهان دارویی استان
فاترک

نام علمی: <i>viscosa</i> (L.) Jacq.
Dodonaea
نام تیره: <i>Sapindaceae</i>
نام فارسی: فاترک
نام محلی: شخف، ششک، بی ششک، مور دنگ، نادر، گی تچ

مشخصات گیاه شناسی: گیاه درختچه‌ای، به ارتفاع ۲۰۰-۱۰۰سانتی‌متر، شاخه‌ها فراوان،چسبناک. ساقه ایستاده، چوبی، با شاخه‌های فراوان ایستاده و با پوستی خاکستری رنگ،برگ متناوب، بدون گوش‌وارک، ساده،تقریباً بدون دم‌برگ،یا دارای دم‌برگ بسیار کوتاه، چمچه‌ای،پهن دراز،یا پهن دراز، سرسبزه‌ای، نوک تیز، گل زرد متمایل به سبز، مجتمع در دپهیم یا خوشه، کاسبرگ ۵-۳، تخم مرغی یا پهن دراز، پرچم ۱۲-۸، تخمدان بیضی و دارای باله‌های کرکران. میوه کپسول، دارای ۲-۳ باله کامل سرتاسری و غشایی.

پراکنش در استان:

کوه چاه شنبه گاو‌بندی، خمینی شهر و جکدان بشنارد، قطب آباد، سیاهو، تنگ زاغ، زاکین، کوه گنو، کوه بان، کوه گاو‌بست و کوه پردی سنگ
مشخصات رویشگاه: این گیاه از ارتفاع ۳۰۰ تا ۲۱۰۰متر در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای در درز و شکاف صخره‌های سنگی، در آبراهه‌های شیب‌دار و بر روی وایزه‌های سنگی و در اراضی سنگلاخی رویش دارد. در برخی مناطق بر روی رسوبات آبرفتی دانه درشت که میزان سنگ و قلوه سنگ زیاد است نیز دیده می‌شود.

ترکیبات شیمیایی: استیگماستروл، سیتوستروл، دودونین، ساپونین، تانن، رزین

مصارف درمانی:

جهت درمان سردرد،استخوان درد و پادرد،همچنین جهت التیام کورک و لمل‌های چرکین، له شده برگ را دور زخم می‌مالند.

- واحد آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان**
- ادامه دارد...**

هرمزگان روزانه ۳۹ تن گوشت مرغ نیاز دارد

معاون بهبود و تولیدات دامی هرمزگان گفت: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان نیاز مردم به مواد پروتئینی از جمله گوشت مرغ بیشتر می‌شود، روزانه ۳۹ تن مرغ گرم مورد نیاز استان است.ابراهیم فغریل در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مردم بخدرعباس در روزهای نخستین ماه مبارک رمضان با مشکل تهیه مرغ گرم روبه‌رو بودند و این به علت طرح سهمیه‌بندی که برای مرغ فروشان در نظر گرفته شده بود اجرایی شد.وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان تقاضا برای مرغ گرم بیشتر می‌شود ابرار داشت: در حال حاضر روزانه ۳۷ تن مرغ گرم تولیدی در بازارهای سطح استان توزیع می‌شود که کمبود آن را با تهیه مرغ منجمد جبران کرده‌ایم.معاون بهبود و تولیدات دامی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط آب و هوایی استان اظهار داشت: در حال حاضر در استان ۲۲۷ مرغداری گوشتی فعال با ظرفیت تولید در هر دور چهار میلیون و ۱۵۰ قطعه فحل است. فغریل اضافه کرد: در طول سال حدود ۱۲ میلیون ۶۰۰ هزار قطعه جوجه وارد استان می‌شود که پس از پرورش تبدیل به مرغ، کشتار وارد بازار عرضه می‌شود.

جاسک ؛ مستعد کشت موز



دقیقی از میزان تولید موز در هرمزگان ارایه نشده اما همه ساله دها تن از نوع بومی این محصول در بازار مصرف این

و توسعه باغ های موز اختصاص یافته که تاکنون درسطح ۵۰۰هکتار از آنها اقداماتی بعمل آمده است . هر چند آمار

خاکهای زراعی هرمزگان با کشت گیاه ماش اصلاح می شوند

آلی خاک کشاورزی این استان است.مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان یادآورشد: دراین راستا این مدیریت با اجرایی طرح کاشت ماش به عنوان تولید کود سبز قصد بالا بردن ماده آلی خاک به واسطه کود سبز در ۵ شهرستان را دارد.

وی از کشت۲۰هکتار ماش در سطح استان خبرداد و ابراز داشت: تا پایان فصل کشت(مردادماه) ۳۰ هکتار در حاجی آباد، ۱۰هکتار در رودان، چهار هکتار نیز در بندرعباس ودر شهرستان های پارسیان ومیناب نیز هر کدام سه هکتار جداگانه کشت خواهد شد.این مقام مسوول از برگرداندن گیاه به خاک از طریق شخم زدن اشاره کرد و اظهار داشت: بایستی قبل از دانه بندی و سیدین و به عبارتی ۱۰روزپس از کشت با شخم زدن گیاه را به عنوان کود سبز به خاک برگرداند تا مواد آلی خاک افزایش پیدا کند.فصل کشت ماش در هرمزگان مردادماه اعلام شده است.

کشت "ذرت" پایان یافت

هر هکتار برداشت شد.
صادقی پیش بینی کرد پس از پایان فصل برداشت بیش از ۵۲ هزار تن محصول با عملکرد هشت تن در هر هکتار از مزارع این استان برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: جهت ارتقای راندمان تولید این محصول طرح های مختلفی در خصوص استفاده از کوههای بیولوژیک آلی ریز مغذی، احداث مزارع الگویی جهت مقایسه ارقام زودرس، متوسط و دیر رس در ارقام برداشت آن اوایل آذرماه تا اواخر دی ماه خواهد بود.

هر

صادقی پیش بینی کرد پس از پایان فصل برداشت بیش از ۵۲ هزار تن محصول با عملکرد هشت تن در هر هکتار از مزارع این استان برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: جهت ارتقای راندمان تولید این محصول طرح های مختلفی در خصوص استفاده از کوههای بیولوژیک آلی ریز مغذی، احداث مزارع الگویی جهت مقایسه ارقام زودرس، متوسط و دیر رس در ارقام برداشت آن اوایل آذرماه تا اواخر دی ماه خواهد بود.

ندای سبز

سال نهم

شماره ۱۰۶۳

دو شنبه

۱ شهریور ۱۳۸۹

۱۲ رمضان ۱۴۳۱

۲۳ آگوست ۲۰۱۰

دبیر صفحه علی نظری

حیات سبز

درباره ریزگرد

♦ ریزگرد توده ای از ذرات جامد ریز غبار و گاه دود و ... است که در جو پخش شده و دید افقی را میان ۲ او ۲ کیلومتر محدود می کند و برای بیماران تنفسی بسیار مضر است ریزگرد همچنین باعث بروز پدیده ماه آبی می شود.
در مریخ ریزگرد رویدادی تقریباً همیشگی است که گاه تا ارتفاع ۳۰ کیلومتری (بیش از ۵ برابر ارتفاع کوه دماوند از سطح انهای آزاد) بالا می رود ودر فصل تابستان شدت گرفته و توفان های شدیدی را ایجاد می کند.
یکی از دلایل بسیاری ازانقراض های بزرگ تاریخ از جمله انقراض دایناسورها پدیده ریزگرد است.زیرا این پدیده در موارد بحرانی باجلوگیری از تابش نور خورشید به زمین موجب زمستان جهانی می شود.نمونه ای از چنین رویدادی در تاریخ بشر در سال ۱۸۱۶ میلادی و در دنبال فوران کوه تامبورا روی داد که سال بی تابستان نام گرفت.

در ایران سرچشمه اصلی ریزگرد باد شمال است. این باد که از خرداد تا شهریور فعال است،در خاورمیانه شکل می گیرد ویا گذر از کوه های ترکیه وشمال عراق مانند قیفی، سرازیر به بیابان های عراق وسوریه می شود و تاخلیج فارس ورسیدن به سطح انبهای آزاد پیش می رود.جریان های خشک هوای عربستان و عدم توجه به محیط زیست ریزگرد در خوزستان، غرب ایران و سرانجام تقریباً در سراسر ایران شد.
بغداد بدترین توفان غبار زندگی شان بود، سبب بیشترین میزان ریزگرد در سه دهه اخیر ایران شد و ترکیب غبار با آلاینده های شهری ریزگرد خطرناکی را تولید کرد.

- واحد آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان**
- ادامه دارد...**

روابط عمومی آب وفاضلاب
روستایی
هرمزگان

صدای قطره های آب، ضربان زندگی

است در

مصرف آن

مصرفه جویی

نماییم



- روابط عمومی**

اداره کل شیلات

هرمزگان